

Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002

Glossario

AA	aminoacidi	MAFA	middle arm fatty area
AAA	aminoacidi aromatici	MAMA	middle arm muscular area
AAE	aminoacidi essenziali	MC	malattia di crohn
AAANE	aminoacidi non essenziali	MCT	medium chain triglycerides
AAR	aminoacidi a catena ramificata	MICI	malattie infiammatorie croniche
ADL	activities of daily living	MNA	mini nutritional assessment
AGE	acidi grassi essenziali	MODS	multiple organ dysfunction syndrome
AIDS	sindrome da immunodeficienza acquisita	MOF	multiple organ failure
AM	anoressia mentale	MOFS	multiple organ failure syndrome
AMA	american medical association	MPC	malnutrizione calorico proteica
ARDS	acute respiratory distress syndrome	MPE	malnutrizione proteico-energetica
BCAA	branched chain amino acid: aminoacidi a catena ramificata	N	azoto
BE	base excess	NA	nutrizione artificiale
BEE	basal energy expenditure	NE	nutrizione enterale
BMI	body mass index o indice di massa corporea	NED	nutrizione enterale domiciliare
BPCO	broncopneumopatia cronica ostruttiva	NP	nutrizione parenterale
BSA	body surface area	NPD	nutrizione parenterale domiciliare
BUN	blood urea nitrogen	NPP	nutrizione parenterale per vena periferica
CC	cachessia cardiaca	NPT	nutrizione parenterale totale
CHF	scompenso cardiaco cronico	NRI	nutritional risk index
CI	colite indeterminata	NYHA	new york heart association
COPD	chronic obstructive pulmonary disease	OS	overfeeding syndrome
CU	colite ulcerosa	PA	pancreatite acuta
CVC	catetere venoso centrale	pBEE	spesa energetica basale predetta
CVVH	emofiltrazione veno-venosa continua	PDH	attività della piruvico-deidrogenasi
CVVHD	emodialisi veno-venosa continua	PEG	percutaneous endoscopic gastrostomy
DCA	disturbi del comportamento alimentare	PEJ	digiuostomia per endoscopica
DPG	2,3 difosfoglicerato	PICC	peripherally inserted central catheter
DSM-IV	diagnostic and statistical manual of mental disorders	PINI	prognostic inflammatory nutritional index
E/T	aminoacidi essenziali/g di azoto totali	PNI	prognostic nutritional index
EAPC	associazione europea di cure palliative	PNX	pneumotorace
ECM	errori congeniti del metabolismo	RAI	recommended adequate intake
EFA	essential fatty acids	RBP	proteina legante il retinolo (retinol binding protein)
EPA	acido eicosapentaenoico	RCT	randomized controlled trial o studio randomizzato controllato
ER	enteropatia da raggi	RCU	rettocolite ulcerosa
FEB	fabbisogno energetico basale	RDA	recommended dietary allowance
FOS	frutto-oligo-saccaridi	REE	resting energy expenditure
FVC	forced vital capacity	rGH	recombinant growth hormone
GCS	glasgow coma scale	RME	resting metabolic expenditure
GIC	glucosio-insulina-potassio	RNA	acido ribonucleico
GLN	glutamina	RS	sindrome da rialimentazione o refeeding syndrome
GVHD	graft-versus-host disease	RT	radioterapia
HAART	highly active antiretroviral therapy	SCFA	acidi grassi a catena corta o short chain fatty acid
H-B	harris-benedict	SGA	subjective global assessment
HDL	high density lipoprotein	SIC	sindrome da intestino corto
HIV	humal immunodeficiency virus	SIFO	Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
IADL	instrumental activities of daily living	SIRS	sindrome da risposta infiammatoria sistemica
ICP	intracranic pressure o pressione intracranica	SLA	sclerosi laterale amiotrofica
IMC	indice di massa corporea	SNG	sondino naso-gastrico
IRA	insufficienza renale acuta	SOF	single organ failure
IRC	insufficienza renale cronica	TEE	total energy expenditure o spesa calorica totale
ISS	injury severity score	TMO	trapianto di midollo osseo
Kcal	kilocalorie	TPN	nutrizione parenterale totale
Kj	kilojoule	UNA	urea nitrogen appearance
LARN	livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti	UTI	unità di terapia intensiva
LCS	sindrome da bassa portata post-chirurgica	VLDL	very low density lipoprotein
LCT	long chain triglycerides	VOD	malattia veno-occlusiva del fegato
LOS	length of stay – durata del ricovero		